

Latvijas 74. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi un atrisinājumi 5.-8. klasei

5. klase


- 5.1. Parādi vienu veidu, kādu ciparu var ierakstīt katrā aplītī, lai iegūtu patiesu vienādību, visi pieci ierakstītie cipari būtu dažādi un neviens no tiem nebūtu 2.

$$2\bigcirc \cdot 2\bigcirc = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$$

Atrisinājums. Der, piemēram, $23 \cdot 26 = 598$.

Piezīme. Der arī $26 \cdot 29 = 754$.


- 5.2. Uz rūtiņu lapas rūtiņu krustpunktos atzīmēti 16 punkti (skat. 1. att.). Kāds mazākais skaits punktu jānodzēš, lai nekādi trīs no atlikušajiem punktiem neatrastos uz vienas taisnes?



1. att.

Atrisinājums. Mazākais punktu, ko jānodzēš, skaits ir 8, piemēram, skat. 2. att.

Pamatosim, ka mazāk punktu nodzēst nav iespējams. Katrā rindā ir jānodzēš vismaz divi punkti (citādi būs taisne, uz kuras atrodas trīs punkti), tātad kopā ir jānodzēš vismaz 8 punkti.



2. att.

- 5.3. Dots kvadrāts ar izmēriem 6×6 rūtiņas, kurā dažas rūtiņas atzīmētas ar "o" un "x" (skat. 3. att.). Parādi, kā šo kvadrātu sagriezt pa rūtiņu līnijām četrās vienādās daļās tā, lai katra daļa saturētu vienu rūtiņu, kurā ierakstīts "o", un vienu rūtiņu, kurā ierakstīts "x"!

Piezīme. Figūras ir vienādas, ja tās var uzlikt vienu uz otras tā, ka abas figūras sakrīt (figūras var pagriezt un apmest otrādi).

					o
		x			
			o		
	x	o		o	
				x	
			x		

3. att.

Atrisinājums. Skat. 4. att.

					o
		x			
			o		
	x	o		o	
					x
			x		

4. att.

- 5.4. Rindā uzrakstīti 2024 skaitļi. Zināms, ka pirmais uzrakstītais skaitlis ir 41 un katru nākamo var iegūt, iepriekšējā skaitļa visu ciparu reizinājumam pieskaitot 23 (piemēram, otrais uzrakstītais skaitlis ir 27, jo $4 \cdot 1 + 23 = 27$). Kāds ir pēdējais uzrakstītais skaitlis?

Atrisinājums. Pēdējais skaitlis ir 29. Aprēķinām pirmos dotās virknes skaitļus:

$$41; 27; 37; 44; 39; 50; 23; 29; 41; 27; 37; \dots$$

Ievērojam, ka, sākot ar 9. virknes locekli, skaitļi sāk periodiski atkārtoties, perioda garums ir 8 skaitļi. Tā kā 2024 dalās ar 8 ($2024 : 8 = 253$), tad 2024. skaitlis būs tāds pats, kā 8. skaitlis, tātad 29.

- 5.5. Ja automātā iemet divus vienādus žetonus, tad tas izdod vienu zaļu žetonu, bet, ja iemet divus dažādus žetonus, tad tas izdod vienu dzeltenu žetonu. Sākumā Dagmārai bija 20 dzelteni un 15 zaļi žetoni. Vai iespējams, ka pēc atkārtotas automāta izmantošanas viņai palika: **a)** divi zaļi un viens dzeltens žetons, **b)** divi dzelteni un viens zaļš žetons?

Atrisinājums. a) Nē, tas nav iespējams. Ievērosim, ka pēc katras darbības dzelteno žetonu skaits vai nu nemainās (tas notiek gadījumos, kad automātā iemet divus zaļus žetonus vai vienu zaļu un vienu dzeltenu žetonu) vai arī samazinās par 2 (tas notiek, ja automātā iemet divus dzeltenus žetonus). Tā kā sākumā dzelteno žetonu skaits bija pāra skaitlis, tad arī pēc jebkuras darbības tas būs pāra skaitlis. Tātad nav iespējams, ka dzelteno žetonu skaits ir 1 (kas ir nepāra skaitlis).

b) Jā, ir iespējams. Dagmāra varēja rīkoties šādi: vispirms 9 reizes iemest automātā 2 dzeltenus žetonus (un saņemt vienu zaļu), pēc 9 šādām darbībām viņai paliktu 24 zaļi žetoni un 2 dzelteni žetoni. Pēc tam 23 reizes jāiemet automātā 2 zaļus žetonus, katru reizi automāts atdotu 1 zaļu žetonu, kā rezultātā zaļo žetonu skaits katrā reizē samazinātos par 1. Tātad beigās viņai paliktu 2 dzelteni žetoni un 1 zaļš žetons.

6. klase


- 6.1. Parādi vienu veidu, kādu ciparu var ierakstīt katrā aplītī, lai iegūtu patiesu vienādību, visi seši ierakstītie cipari būtu dažādi un neviens no tiem nebūtu 3.

$$3\bigcirc \cdot 3\bigcirc = \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$$

Atrisinājums. Der, piemēram, $34 \cdot 37 = 1258$.

Piezīme. Der arī $37 \cdot 38 = 1406$.


- 6.2. Kāds ir lielākais skaits 7. att. doto figūru, ko var izgriezt no 5. att. dotās figūras, ja jābūt izgrieztām arī tieši divām 6. att. figūrām?



5. att.




6. att.




7. att.

Atrisinājums. Lielākais skaits figūru ir 14, piemēram, skat. 8. att. Pamosim, ka vairāk 7. att. figūru nevar izgriezt.

Iekrāsojot 5. att. figūru šaha galdiņa veidā, iegūstam 33 pelēkas rūtiņas un 36 baltas rūtiņas (skat. 9. att.). Lai kā izgrieztu 6. att. un 7. att. dotās figūras, tās vienmēr noklāj tieši 2 pelēkas rūtiņas (skat. 10. att.). Tas nozīmē, ka no 5. att. dotās figūras var izgriezt ne vairāk kā 16 figūras, jo 17 figūras noklātu jau $17 \cdot 2 = 34$ pelēkās rūtiņas. Tā kā jāizgriež divas 6. att. figūras, tad 7. att. figūras var izgriezt ne vairāk kā 14.



8. att.




9. att.



10. att.


- 6.3. Dots kvadrāts ar izmēriem 6×6 rūtiņas, kurā dažas rūtiņas atzīmētas ar "o" un "x" (skat. 11. att.). Parādi, kā šo kvadrātu sagriezt pa rūtiņu līnijām četrās vienādās daļās tā, lai katra daļa saturētu vienu rūtiņu, kurā ierakstīts "o", un vienu rūtiņu, kurā ierakstīts "x"!

Piezīme. Figūras ir vienādas, ja tās var uzlikt vienu uz otras tā, ka abas figūras sakrīt (figūras var pagriezt un apmest otrādi).



11. att.

Atrisinājums. Skat. 12. att.



12. att.

- 6.4. Rindā uzrakstīti 2024 skaitļi. Zināms, ka pirmais uzrakstītais skaitlis ir 49 un katru nākamo var iegūt, iepriekšējā skaitļa visu ciparu reizinājumam pieskaitot 19 (piemēram, otrais uzrakstītais skaitlis ir 55, jo $4 \cdot 9 + 19 = 55$). Kāds ir pēdējais uzrakstītais skaitlis?

Atrisinājums. Pēdējais uzrakstītais skaitlis ir 37. Aprēķinām pirmos dotās virknes skaitļus:

$$49; 55; 44; \underline{35}; 34; 31; 22; 23; 25; 29; 37; 40; 19, 28, 35, 34, 31, \dots$$


levērojam, ka, sākot ar 15. virknes locekli, skaitļi sāk periodiski atkārtoties, perioda garums ir 11. Tā kā 2024 dalās ar 11 ($2024 = 11 \cdot 184$), tad 2024. skaitlis būs tāds pats, kā 11. skaitlis, tātad 37.

Piezīme. Var arī spriest, ka meklē virknes, kas sākas ar skaitli 35 (noņemot dotās virknes pirmos trīs skaitļus), pēdējo skaitli. Tādā gadījumā $2021 : 11 = 183, A 8$, tāpēc meklētais skaitlis ir perioda 8. skaitlis un tas ir 37.

- 6.5. Vai var uzzīmēt tādu slēgtu lauztu līniju no **a)** 6 posmiem, **b)** 7 posmiem, kas katru savu posmu krusto tieši vienu reizi?

Piezīme. Par lauztu līniju sauc līniju, kas sastāv no galīga skaita taisnes nogriežņiem, ko sauc par posmiem. Lauztu līniju, kuras galapunkti sakrīt, sauc par slēgtu lauztu līniju.

Atrisinājums. a) Jā, var, piemēram, skat. 13. att.



13. att.

b) Nē, nevar. Ievērosim, ka šādas lauztās līnijas posmus var sadalīt pa pāriem, katrā pāri saliekot divus posmus, kas krustojas. Tātad šādas lauztās līnijas posmu skaitam jābūt pāra skaitlim, bet 7 ir nepāra skaitlis.

7. klase

- 7.1. Katrā tukšajā aplītī ierakstīt vienu darbību zīmi (+, −, ·, :) tā, lai taisnstūros iegūtās izteiksmju vērtības būtu naturāli skaitļi un visas sešas kopā saturētu visus ciparus no 1 līdz 9, katru ciparu tieši vienu reizi! (Iekavas lietot nedrīkst un jāievēro darbību secība.)

$$\begin{array}{cccc}
 9 & \bigcirc & 8 & \bigcirc & 7 & = & \square \\
 \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & & \\
 6 & \bigcirc & 5 & \bigcirc & 4 & = & \square \\
 \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & & \\
 3 & \bigcirc & 2 & \bigcirc & 1 & = & \square \\
 \parallel & & \parallel & & \parallel & & \\
 \square & & \square & & \square & &
 \end{array}$$

Atrisinājums. Skat. 14. att.

$$\begin{array}{cccc}
 9 & \cdot & 8 & + & 7 & = & \boxed{79} \\
 + & & - & & - & & \\
 6 & \cdot & 5 & + & 4 & = & \boxed{34} \\
 + & & + & & - & & \\
 3 & + & 2 & + & 1 & = & \boxed{6} \\
 \parallel & & \parallel & & \parallel & & \\
 \boxed{18} & & \boxed{5} & & \boxed{2} & &
 \end{array}$$

14. att.

- 7.2. Kāda lielākā ciparu summa var būt desmitciparu skaitlim, kas dalās ar 18?

Atrisinājums. Lielākā iespējamā ciparu summa ir 81. Tāda ir, piemēram, skaitlim 999999990, tas dalās, gan ar 9, gan ar 2, tātad tas dalās arī ar $9 \cdot 2 = 18$.

Pamatosim, ka lielāka ciparu summa nav iespējama. Lai skaitlis dalītos ar 18, tam jādalās arī ar 9, tātad tā ciparu summai jādalās ar 9. Lielākā iespējamā desmitciparu skaitļa ciparu summa ir $9 \cdot 10 = 90$. Tāda ciparu summa ir tikai skaitlim 999999999, tomēr tas nedalās ar 18. Nākamā lielākā iespējamā ciparu summa ir $90 - 9 = 81$ (kas dalās ar 9), tātad tā ir meklētā ciparu summa.

- 7.3. Plaknē atlikti četri punkti A, B, C, D . Zināms, ka $AB = 4$, $BC = 7$, $CD = 10$ un $DA = 3$. Kāds var būt nogriežņa AC garums, ja zināms, ka tas ir naturāls skaitlis?


Atrisinājums. No trijstūra nevienādības $\triangle ABC$ un $\triangle ADC$ (pieļaujot, ka punkti atrodas arī uz vienas taisnes) attiecīgi iegūstam:

- $AC \leq AB + BC = 4 + 7 = 11$ un $AC \geq BC - AB = 7 - 4 = 3$;
- $AC \leq AD + DC = 3 + 10 = 13$ un $AC \geq CD - AD = 10 - 3 = 7$.

Tātad $AC \geq 7$ un $AC \leq 11$. Šiem nosacījumiem atbilst naturālie skaitļi 7; 8; 9; 10 un 11.

Tā kā dotajiem nogriežņu garumiem un nogriežņu garumiem 8; 9; 10 izpildās trijstūra nevienādības nosacījumi, tad šādas AC vērtības ir iespējamas. Nogriežņa AC garums var būt 11, tad punkti A, B, C atrodas uz vienas taisnes (tieši šādā secībā), bet punkts D neatrodas uz šīs taisnes ($\triangle ADC$ eksistē, jo tā malu garumiem izpildās trijstūra nevienādība). Nogriežņa AC garums var būt 7, tad punkti C, A, D atrodas uz vienas taisnes (tieši šādā secībā), bet punkts B neatrodas uz šīs taisnes ($\triangle ABC$ eksistē, jo tā malu garumiem izpildās trijstūra nevienādība).

- 7.4. No 15. att. un 16. att. figūrām, katru izmantojot vismaz vienu reizi, salikt taisnstūri, kurā 16. att. figūras nesaskaras ne ar malu, ne ar stūri! Figūras drīkst pagriezt.




15. att.



16. att.

Atrisinājums. Skat., piemēram, 17. att.



17. att.

- 7.5. Konditorejā nopērkamas 10 tortes, to cena ir attiecīgi 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 eiro (katra torte ir tieši vienā eksemplārā). Konditorejā viens pēc otra iegriezās 3 gardēži, katrs no tiem nopirka sev dažas tortes, turklāt katrs iztērēja ne vairāk kā 85 eiro. Pierādīt, ka pēc gardēžu apmeklējuma vismaz viena torte vēl palika nenopirkta!

1. atrisinājums. Ievērosim, ka katrs gardēdis varēja nopirkt ne vairāk kā 3 tortes, jo pat 4 vislētākās tortes kopā maksā 86 eiro ($20 + 21 + 22 + 23 = 86$). Tātad visi trīs gardēži kopā varēja nopirkt ne vairāk kā $3 \cdot 3 = 9$ tortes, tātad vismaz viena torte palika nenopirkta.

2. atrisinājums. Pieņemsim pretējo, ka trīs gardēži kopā nopirkuši visas tortes. Tad pēc Dirihlē principa var atrast gardēdi, kurš ir nopircis vismaz 4 tortes. Bet pat 4 vislētākās tortes kopā maksā $20 + 21 + 22 + 23 = 86$, kas ir vairāk nekā katrs gardēdis ir iztērējis (85 eiro). Tātad kopā nopirka ne vairāk kā $3 \cdot 3 = 9$ tortes, līdz ar to vismaz viena torte palika nenopirkta.

8. klase


8.1. Vai iespējams, sareizinot sešus dažādus pirmkaitļus, iegūt sešciparu skaitli, kam visi cipari ir vienādi?

Atrisinājums. Jā, var, piemēram, der sešciparu skaitlis $222222 = 2 \cdot 3 \cdot 37 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$.

Piezīme. Der arī skaitlis $555555 = 5 \cdot 3 \cdot 37 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$.

8.2. Vienādsānu trijstūrī ABC ($AB = AC$) uz malām BC un AC atlikti attiecīgi punkti D un E tā, lai $AE = AD$ un $\sphericalangle BAD = 30^\circ$. Aprēķināt leņķi CDE .


Atrisinājums. Tā kā $AB = AC$, tad $\sphericalangle B = \sphericalangle C = \alpha$ (skat. 18. att.). No trijstūra ABC iekšējo leņķu summas iegūstam, ka $\sphericalangle BAC = 180^\circ - 2 \cdot \sphericalangle B = 180^\circ - 2\alpha$. Tātad $\sphericalangle DAE = \sphericalangle BAC - \sphericalangle BAD = 180^\circ - 2\alpha - 30^\circ = 150^\circ - 2\alpha$. Tā kā $AD = AE$, tad trijstūris ADE ir vienādsānu un $\sphericalangle ADE = \sphericalangle AED = (180^\circ - \sphericalangle DAE) : 2 = (180^\circ - (150^\circ - 2\alpha)) : 2 = 15^\circ + \alpha$. Ievērojot, ka $\sphericalangle DEC = 180^\circ - \sphericalangle AED = 180^\circ - (15^\circ + \alpha) = 165^\circ - \alpha$. Izmantojot trijstūra iekšējo leņķu summu $\triangle DEC$, iegūstam, ka $\sphericalangle CDE = 180^\circ - \sphericalangle DEC - \sphericalangle ECD = 180^\circ - (165^\circ - \alpha) - \alpha = 15^\circ$.




18. att.

8.3. Uz rūtiņu lapas rūtiņu krustpunktos atzīmēti 25 punkti (skat. 19. att.). Kāds mazākais skaits punktu jānodzēš, lai nekādi trīs no atlikušajiem punktiem neatrastos uz vienas taisnes?

Piezīme. Ievēro, ka uz vienas taisnes atrodas ne tikai punkti, kas atrodas vienā rindā, kolonnā vai diagonālē, bet arī, piemēram, punkti A, B, C (skat. 20. att.)!




19. att.



20. att.

Atrisinājums. Mazākais punktu, ko jānodzēš, skaits ir 15, piemēram, skat. 21. att.

Pamatosim, ka mazāk punktu nodzēst nav iespējams. Katrā rindā ir jānodzēš vismaz trīs punkti (citādi būs taisne, uz kuras atrodas trīs punkti), tātad kopā ir jānodzēš vismaz 15 punkti.




21. att.

8.4. Konditorejā nopērkamas 16 tortes, to cena ir attiecīgi 30; 31; 32; ...; 45 eiro (katra torte ir tieši vienā eksemplārā). Konditorejā viens pēc otra iegriezās 5 gardēži, katrs no tiem nopirka sev dažas tortes, turklāt katrs iztērēja ne vairāk kā 125 eiro. Pierādīt, ka pēc gardēžu apmeklējuma vismaz viena torte vēl palika nenopirkta!


1. **atrisinājums.** Ievērosim, ka katrs gardēdis varēja nopirkt ne vairāk kā 3 tortes, jo pat 4 vislētākās tortes kopā maksā 126 eiro ($30 + 31 + 32 + 33 = 126$). Tātad visi trīs gardēži kopā varēja nopirkt ne vairāk kā $3 \cdot 5 = 15$ tortes, tātad vismaz viena torte palika nenopirkta.

2. **atrisinājums.** Pieņemsim pretējo, ka trīs gardēži kopā nopirkuši visas tortes. Tā kā $16 = 5 \cdot 3 + 1$, tad pēc Dirihlē principa var atrast gardēdi, kurš ir nopircis vismaz 4 tortes. Bet pat 4 vislētākās tortes kopā maksā $30 + 31 + 32 + 33 = 126$, kas ir vairāk nekā katrs gardēdis ir iztērējis (125 eiro). Tātad kopā nopirka ne vairāk kā $3 \cdot 5 = 15$ tortes, līdz ar to vismaz viena torte palika nenopirkta.

8.5. Vai **a)** 22. att., **b)** 23. att. dotā kvadrāta rūtiņās var ierakstīt deviņus dažādus naturālus skaitļus tā, lai katrā rūtiņā būtu ierakstīts viens skaitlis un katrā rindā un katrā kolonnā skaitļi pieaugtu bultiņas norādītajā virzienā?




22. att.




23. att.

Atrisinājums. a) Jā, var, piemēram, skat. 24. att.



24. att.

b) Nē, nevar. Aplūkosim rūtiņas B1, B2, B3, B4 (skat. 25. att.). Ņemot vērā bultiņu virzienu, skaitļiem jābūt sakārtotiem šādi: $B1 < B2 < B3 < B4 < B1$. Tā kā skaitlis nevar būt mazāks pats par sevi, tad šāds skaitļu izvietojums nav iespējams.



25. att.

Latvijas 74. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi un atrisinājumi

9.-12. klase


9. klase

9.1. Dots izliekts četrstūris $KL MN$. Zināms, ka $\sphericalangle LKN = \sphericalangle MNK$ un malu KL un MN vidusperpendikulu krustpunkts X atrodas uz malas KN . Pierādīt, ka $KM = LN$!

Atrisinājums. Pēc vidusperpendikula īpašības iegūstam, ka $KX = XL$ un $XN = XM$, tātad $\triangle KXL$ un $\triangle MXN$ ir vienādsānu trijstūri un to pamata pieleņķi ir vienādi, tas ir, $\sphericalangle XKL = \sphericalangle XLK$ un $\sphericalangle XMN = \sphericalangle XNM$ (skat. 1. att.). Ievērojot, ka $\sphericalangle KXL = 180^\circ - 2\sphericalangle XKL = 180^\circ - 2\sphericalangle XNM = \sphericalangle MXN$. Tātad $\sphericalangle KXM = \sphericalangle KXL + \sphericalangle LXM = \sphericalangle MXN + \sphericalangle LXM = \sphericalangle LXN$ un $\triangle KXM = \triangle LXN$ pēc pazīmes mlm :

- $KX = LX$;
- $\sphericalangle KXM = \sphericalangle LXN$;
- $XM = XN$.

Tātad $KM = LN$ kā atbilstošās malas vienādos trijstūros.



1. att.

9.2. Pierādīt, ka $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 3$.

1. atrisinājums. Katru zemsaknes izteiksmi izteiksim kā summas vai starpības kvadrātu un veiksime ekvivalentus pārveidojumus:

$$\begin{aligned} & \sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \\ &= \sqrt{3^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} + (2\sqrt{2})^2} + \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 1 + 1^2} + \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 1 + 1^2} = \\ &= \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} + \sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2} + \sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2} = |3 - 2\sqrt{2}| + |\sqrt{2} - 1| + |\sqrt{2} + 1| = \\ &= 3 - 2\sqrt{2} + \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2} + 1 = 3. \end{aligned}$$

2. atrisinājums. Veicame ekvivalentus pārveidojumus:

$$\begin{aligned} & \sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 3; \\ & \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 3 - \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Ievērojam, ka $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} < \sqrt{9}$, tāpēc vienādības labās puses izteiksmes vērtība ir pozitīva, un varam kāpināt kvadrātā abas vienādības puses, pēc tam veicam ekvivalentus pārveidojumus:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}\right)^2 &= \left(3 - \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}\right)^2; \\ 3 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{(3 - 2\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})} + 3 + 2\sqrt{2} &= 9 - 6\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + 17 - 12\sqrt{2}; \\ 3 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{9 - 8} + 3 + 2\sqrt{2} &= 9 - 6\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + 17 - 12\sqrt{2}; \\ 6\sqrt{17 - 12\sqrt{2}} &= 18 - 12\sqrt{2}. \end{aligned}$$


Ievērojam, ka $12\sqrt{2} < 18$, tāpēc abas vienādības puses ir pozitīvas un varam tās kāpināt kvadrātā, pēc tam veicam ekvivalentus pārveidojumus:

$$\begin{aligned} \left(6\sqrt{17 - 12\sqrt{2}}\right)^2 &= (18 - 12\sqrt{2})^2; \\ 36 \cdot (17 - 12\sqrt{2}) &= 324 - 18 \cdot 24\sqrt{2} + 288; \\ 612 - 36 \cdot 12\sqrt{2} &= 612 - 18 \cdot 24\sqrt{2}; \\ 3 \cdot 12 \cdot 12\sqrt{2} &= 3 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 12\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Tā kā tika veikti ekvivalenti pārveidojumi un iegūta patiesa vienādība, tad arī dotā vienādība ir patiesa.

9.3. Uz kvadrāta $ABCD$ diagonāles BD atlikts punkts E . Pierādīt, ka $ED \cdot EB + EA \cdot EC = AB^2$!

Atrisinājums. Apzīmējam diagonāļu krustpunktu ar O ; $BD = d$ un $OE = x$. Diagonāle BD ir kvadrāta simetrijas ass, tāpēc $EA = EC$ (skat. 2. att.).



2. att.

Kvadrāta diagonāles ir perpendikulāras un krustpunktā dalās uz pusēm, tāpēc trijstūris AOE ir taisnleņķa trijstūris, kurā pēc Pitagora teorēmas iegūstam, ka $EA^2 = AO^2 + OE^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 + x^2$. Tādā gadījumā iegūstam:

$$\begin{aligned} ED \cdot EB + EA \cdot EC &= (OD - OE)(OB + OE) + EA^2 = \\ &= \left(\frac{d}{2} - x\right)\left(\frac{d}{2} + x\right) + \left(\frac{d}{2}\right)^2 + x^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 + x^2 = 2 \cdot \frac{d^2}{4} = \frac{d^2}{2}. \end{aligned}$$


Izmantojot Pitagora teorēmu vienādsānu taisnleņķa trijstūrī ABD , iegūstam, ka $AB^2 + AD^2 = BD^2$. Tā kā $AB = AD$, tad $2AB^2 = d^2$ jeb $AB^2 = \frac{d^2}{2}$.

Līdz ar to esam ieguvuši, ka $ED \cdot EB + EA \cdot EC = \frac{d^2}{2} = AB^2$.

- 9.4. Taisnstūrī ar izmēriem 4×6 rūtiņas sākotnēji katrā rūtiņā atradās tieši viens kaķis. Vienā brīdī katrs kaķis pārlēca uz kādu no blakus rūtiņām (katrs kaķis pārlēca tieši vienu reizi). Vai var gadīties, ka tagad visi kaķi atrodas tieši: **a)** 8 rūtiņās; **b)** 7 rūtiņās?

Piezīme. Divas rūtiņas sauc par blakus rūtiņām, ja tām ir kopīga mala.

Atrisinājums. a) Jā, var, piemēram, skat. 3. att., kur visi kaķi atrodas pelēkajās rūtiņās (katrs kaķis no baltās rūtiņas varēja pārlēkt uz kādu pelēko rūtiņu, un kaķi, kas sākumā atradās kādā no pelēkajām rūtiņām, pārlēca uz blakus esošo pelēko rūtiņu).



3. att.

Piezīme. Der arī piemērs, kur kaķi pārlec uz otrās un piektās kolonnas rūtiņām.

b) Nē, nevar. Pierādīsim, ka kaķi tagad atrodas vismaz 8 rūtiņās.

Aplūkojam tos 8 kaķus, kas sākumā atradās 3. att. iekrāsotajās rūtiņās, un ievērosim, ka nekādi divi no tiem pēc pārlēkšanas nevar atrasties vienā un tajā pašā rūtiņā. Lai divi kaķi no pelēkajām rūtiņām varētu nonākt vienā un tajā pašā rūtiņā, būtu jābūt tādai rūtiņai, kurai divas blakus rūtiņas ir pelēkā krāsā, bet tādas rūtiņas nav. Tātad pēc pārlēkšanas kaķi atradīsies vismaz 8 rūtiņās.

- 9.5. Dots naturāls skaitlis, kura cipari ir sakārtoti augošā secībā (katrs cipars, izņemot pirmo, ir lielāks nekā tā kaimiņš kreisajā pusē). Pierādīt, ka 9 reizes lielāka skaitļa ciparu summa ir 9.

Atrisinājums. Ievērojam, ka $9x = 10x - x = \overline{x0} - x$. Apzīmējam $x = \overline{a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n}$ un aplūkojam skaitļa $9x = \overline{x0} - x$ ciparus, ievērojot, ka ciparu virkne ir augoša:


$$\begin{array}{rcccccccc}
 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n & 0 \\
 - & & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-2} & a_{n-1} & a_n \\
 \hline
 & a_1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_2 & \dots & a_{n-1} - a_{n-2} & a_n - a_{n-1} - 1 & 10 - a_n
 \end{array}$$

Aplūkojot skaitļa $9x$ ciparu summu, iegūstam prasīto:

$$a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{n-1} - a_{n-2}) + (a_n - a_{n-1} - 1) + 10 - a_n = 9.$$

- 10.1.** Dotas divas riņķa līnijas ω_1 un ω_2 , kas krustojas punktos X un Y . Taisne t_1 , kas vilkta caur X , krusto ω_1 un ω_2 attiecīgi punktos A un B (punkts X atrodas starp A un B), savukārt taisne t_2 , kas vilkta caur Y , krusto ω_1 un ω_2 attiecīgi punktos C un D (punkts Y atrodas starp C un D). Pierādīt, ka AC ir paralēla ar BD !

Atrisinājums. Apzīmējam $\sphericalangle ACY = \alpha$ (skat. 4. att.). Tā kā četrstūris $CAXY$ ir ievilkts četrstūris, tad tā pretējo leņķu summa ir 180° , tātad $\sphericalangle AXY = 180^\circ - \alpha$. Ievērojām, ka $\sphericalangle BXY = 180^\circ - \sphericalangle AXY = \alpha$ (blakusleņķu īpašība). Tā kā četrstūris $BDYX$ ir ievilkts četrstūris, tad tā pretējo leņķu summa ir 180° . Tātad $\sphericalangle BDY = 180^\circ - \sphericalangle BXY = 180^\circ - \alpha$. Tā kā $\sphericalangle ACY + \sphericalangle BDY = \alpha + 180^\circ - \alpha = 180^\circ$ un tie ir iekšējie vienaspusleņķi pie taisnēm AC un BD , kuras krusto taisne t_2 , tad $AC \parallel BD$.



4. att.

- 10.2.** Doti reāli skaitļi x un y , kuriem $xy^3 + 1 = x + y^3$. Pierādīt, ka $yx^3 + 1 = y + x^3$.

Atrisinājums. Veicam ekvivalentus pārveidojumus un sadalām vienādības kreiso pusi reizinātājos:

$$xy^3 + 1 - x - y^3 = 0;$$

$$x(y^3 - 1) - (y^3 - 1) = 0;$$


$$(y^3 - 1)(x - 1) = 0.$$

Tā kā reizinājums ir vienāds ar 0, tad $y^3 - 1 = 0$ vai $x - 1 = 0$ jeb $y = 1$ vai $x = 1$. Apskatām abus gadījumus:

- ja $y = 1$, tad vienādība $yx^3 + 1 = y + x^3$ ir patiesa, jo $x^3 + 1 = 1 + x^3$;
- ja $x = 1$, tad vienādība $yx^3 + 1 = y + x^3$ ir patiesa, jo $y + 1 = y + 1$.

- 10.3.** Šaurleņķu trijstūra ABC malu garumi ir $AB = 7$ cm, $AC = 12$ cm un $BC = 13$ cm. Pierādīt, ka uz malas AC var atrast tādus divus iekšējus punktus P un Q , ka nogriežņu AP , AQ , BP un BQ garumi ir izsakāmi veselā skaitā centimetru!

Atrisinājums. Punkti P un Q jāatliek tā, ka $AP = 2$ cm un $AQ = 5$ cm (skat. 5. att.). Parādīsim, ka šādā gadījumā $BP = 7$ cm un $BQ = 8$ cm.



5. att.

Pret malu AC novelkam augstumu BD . Izmantojot Pitagora teorēmu trijstūros BDA un BDC , iegūstam, ka $AB^2 - AD^2 = BD^2 = BC^2 - DC^2$. Tā kā $AC = 12$ cm, tad varam izteikt, ka $CD = 12 - AD$. Līdz ar to iegūstam, ka

$$7^2 - AD^2 = 13^2 - (12 - AD)^2;$$

$$49 - AD^2 = 169 - (144 - 24AD + AD^2);$$

$$24AD = 24 \Rightarrow AD = 1 \text{ cm.}$$

Izmantojot Pitagora teorēmu trijstūrī ADB , iegūstam, ka $BD^2 = AB^2 - AD^2 = 48$.

Tā kā $DP = AP - AD = 2 - 1 = 1$ cm, tad pēc Pitagora teorēmas $\triangle BDP$ iegūstam, ka $BP = \sqrt{BD^2 + DP^2} = \sqrt{48 + 1} = 7$ cm.

Tā kā $DQ = AQ - AD = 5 - 1 = 4$ cm, tad pēc Pitagora teorēmas $\triangle BDQ$ iegūstam, ka $BQ = \sqrt{BD^2 + DQ^2} = \sqrt{48 + 16} = 8$ cm.

Piezīmes

1. Augstumu BD var aprēķināt arī, izmantojot trijstūra laukumu (pēc Hērona formulas).

2. Vajadzīgos punktus var iegūt, mēģinot kombinēt dažādus malu garumus, lai iegūtu, ka hipotenūzas garums ir vesels skaitlis.

10.4. Atrast visus tādus veselu skaitļu pārus $(a; b)$, kuriem izpildās vienādība $(a + b)^2 = a^3 + b^3$.

Atrisinājums. Sadalām vienādības labo pusi reizinātājos:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a^2 - ab + b^2).$$

Ievērojam, ka jebkuram skaitļu pārim $(a; b)$, kuram $a + b = 0$, dotā vienādība ir identitāte, jo tad abas puses ir vienādas ar 0. Tātad der skaitļu pāri $(k; -k)$, kur k ir vesels skaitlis.

Apskatām gadījumu, kad $a + b \neq 0$. Dotās vienādības abas puses dalām ar izteiksmi $a + b \neq 0$ un iegūstam:

$$a + b = a^2 - ab + b^2.$$

Veicot ekvivalentus pārveidojumus, iegūstam:

$$a^2 - a - ab + b^2 - b = 0;$$

$$2a^2 - 2a - 2ab + 2b^2 - 2b = 0;$$

$$(a^2 - 2ab + b^2) + a^2 - 2a + b^2 - 2b = 0;$$

$$(a - b)^2 + (a^2 - 2a + 1) + (b^2 - 2b + 1) - 2 = 0;$$

$$(a - b)^2 + (a - 1)^2 + (b - 1)^2 = 2.$$

Tā kā a un b ir veseli skaitļi, tad vienīgais veids, kā trīs veselu skaitļu kvadrātu summai iegūt vērtību 2, ir, ja viens saskaitāmais ir 0, bet atlikušie divi ir 1. Apskatām visus gadījumus.

- Ja $a - b = 0$ jeb $a = b$, tad pārējiem saskaitāmajiem jābūt vienādiem ar 1, tātad $a - 1 = b - 1 = 1$ vai arī $a - 1 = b - 1 = -1$ (šis gadījums neder, jo $a + b \neq 0$). Tātad $a = b = 2$ jeb der skaitļu pāris $(2; 2)$.
- Ja $a - 1 = 0$ jeb $a = 1$, tad $(1 - b)^2 + (b - 1)^2 = 2(b - 1)^2 = 2$ jeb $b = 0$ vai $b = 2$, līdz ar to iegūstam divus atrisinājumus $(1; 0)$ un $(1; 2)$.
- Gadījums, kad $b - 1 = 0$, ir simetrisks iepriekšējam, tad secinām, ka der arī skaitļu pāri $(2; 1)$ un $(0; 1)$.

Līdz ar to esam ieguvuši, ka derīgie skaitļu pāri ir: $(1; 0)$, $(1; 2)$, $(0; 1)$, $(2; 1)$, $(2; 2)$ un $(k; -k)$, kur k ir vesels skaitlis.


Piezīme. Vienādojumu $a + b = a^2 - ab + b^2$ var risināt arī kā kvadrātviendājumu $a^2 - (b + 1)a + b^2 - b = 0$ attiecībā pret nezināmo a , tad $D = -3b^2 + 6b + 1$, kuram ir reālas saknes, ja $D \geq 0$ jeb $b \in \left[\frac{3-2\sqrt{3}}{3}; \frac{3+2\sqrt{3}}{3}\right]$.

Pārbauda veselās b vērtības, kas atrodas atbilstošajā intervālā, tās ir 0; 1; 2.

10.5. Taisnstūrī ar izmēriem 8×10 rūtiņas sākotnēji katrā rūtiņā atradās tieši viena varde. Vienā brīdī katra varde pārlēca uz kādu no blakus rūtiņām (katra varde pārlēca tieši vienu reizi). Vai var gadīties, ka tagad visas vardes atrodas tieši: **a)** 24 rūtiņās; **b)** 23 rūtiņās?

Piezīme. Divas rūtiņas sauc par blakus rūtiņām, ja tām ir kopīga mala.

Atrisinājums. a) Jā, var, piemēram, skat. 6. att., kur visas vardes ir nonākušas pelēkajās rūtiņās (katra varde no baltās rūtiņas varēja pārlēkt uz kādu pelēko rūtiņu, un vardes, kas sākumā atradās kādā no pelēkajām rūtiņām, pārlēca uz blakus esošo pelēko rūtiņu).




6. att.

b) Nē, nevar. Pierādīsim, ka vārdes atrodas vismaz 24 rūtiņās.

Aplūkosim tās 24 vārdes, kas sākumā atradās 6. att. iekrāsotajās rūtiņās, un ievērosim, ka nekādas divas no tām pēc pārlēkšanas nevar atrasties vienā un tajā pašā rūtiņā. Lai divas vārdes no pelēkajām rūtiņām varētu nonākt vienā un tajā pašā rūtiņā, būtu jābūt tādai rūtiņai, kurai divas blakus rūtiņas ir pelēkā krāsā, bet tādas rūtiņas nav. Tātad pēc pārlēkšanas vārdes atradīsies vismaz 24 rūtiņās.

11.1. No punkta A , kas atrodas ārpus riņķa līnijas ar centru O , novilkta divas pieskares, kas pieskaras riņķa līnijai punktos D un E . Uz taisnēm AD un AE atliekti attiecīgi punkti B un C tā, ka punkts D atrodas starp A un B , punkts C atrodas starp A un E un $OB = OC$. Pierādīt, ka punkti O, A, B un C atrodas uz vienas riņķa līnijas!

Atrisinājums. Tā kā $OD = OE$ (rādiusi) un $OB = OC$ (dots), tad abi taisnleņķa trijstūri ODB un OCE ir vienādi pēc pazīmes hk , tātad to atbilstošie leņķi ir vienādi: $\sphericalangle OBD = \sphericalangle OCE$ (skat. 7. att.). Ievērosim, ka pēc blakusleņķu īpašības $\sphericalangle OCA = 180^\circ - \sphericalangle OCE = 180^\circ - \sphericalangle OBD$, tātad $\sphericalangle OBA + \sphericalangle OCA = \sphericalangle OBD + (180^\circ - \sphericalangle OBD) = 180^\circ$. Tātad ap četrstūri $OCAB$ var apvilkt riņķa līniju un punkti O, A, B un C atrodas uz vienas riņķa līnijas.



7. att.

11.2. Reāliem skaitļiem x un y ir spēkā vienādība: $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = 5$. Pierādīt, ka $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} + \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} < 3$.

1. atrisinājums. Reizinot dotās vienādības abas puses ar $(x^2 - y^2) \neq 0$, iegūstam:

$$(x+y)^2 + (x-y)^2 = 5(x^2 - y^2);$$

$$2x^2 + 2y^2 = 5x^2 - 5y^2 \quad \Rightarrow \quad y^2 = \frac{3}{7}x^2.$$

Ievietojam iegūto sakarību pierādāmās nevienādības kreisās puses izteiksmē:

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{10}{7}x^2}{\frac{4}{7}x^2} + \frac{\frac{4}{7}x^2}{\frac{10}{7}x^2} = \frac{5}{2} + \frac{2}{5} = \frac{29}{10} < 3.$$

2. atrisinājums. Vienādojot saucējus izteiksmē $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y}$, iegūstam, ka

$$\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = \frac{(x+y)^2 + (x-y)^2}{(x+y)(x-y)} = \frac{x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2}{x^2 - y^2} = 2 \cdot \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}.$$


Tātad, ja $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = 5$, tad $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} = \frac{5}{2}$ un

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{5}{2} + \frac{2}{5} = \frac{29}{10} < 3.$$

11.3. Taisnleņķa trijstūrī ABC ($\sphericalangle ABC = 90^\circ$) uz malas BC atliekti punkti D un E tā, ka $\sphericalangle BAD = \sphericalangle DAE$, $\sphericalangle EAC = 2\sphericalangle BAD$, $BD = 3$, $DE = 4$. Aprēķināt EC garumu!

Atrisinājums. Apzīmējam $EC = x$, $\sphericalangle BAD = \sphericalangle DAE = \alpha$, $\sphericalangle EAC = 2\alpha$ un atliekam punktiem D un E attiecīgi simetriskus punktus D_1 un E_1 pret taisni AB (skat. 8. att.). Tātad $BD_1 = BD = 3$ un $DE = D_1E_1 = 4$. Izmantosim bisektrises īpašību un nogriežņu garumu vienādību $AE_1 = AE$ (simetrijas dēļ):

- 1) $\triangle BAC$ bisektrise AE : $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{EC} = \frac{7}{x}$;
- 2) $\triangle BAE$ bisektrise AD : $\frac{AB}{AE} = \frac{BD}{DE} = \frac{3}{4}$;
- 3) $\triangle E_1AC$ bisektrise AD : $\frac{AE_1}{AC} = \frac{E_1D}{DC} \Rightarrow \frac{AE}{AC} = \frac{10}{4+x}$.



No 2) un 3) iegūstam, ka $\frac{AB}{AC} = \frac{AB}{AE} \cdot \frac{AE}{AC} = \frac{3}{4} \cdot \frac{10}{4+x} = \frac{30}{4(4+x)}$. 8. att.

Izmantojot 1), iegūstam:

$$\frac{30}{4(4+x)} = \frac{7}{x} \Rightarrow 30x = 112 + 28x \Rightarrow x = 56.$$

Tātad $EC = x = 56$.

11.4. Pierādīt: ja a, b, c ir naturāli skaitļi un $a + \text{LKD}(a, b) = b + \text{LKD}(b, c) = c + \text{LKD}(c, a)$, tad $a = b = c$.

Piezīme. Ar $\text{LKD}(a, b)$ ir apzīmēts skaitļu a un b lielākais kopīgais dalītājs.

1. atrisinājums. Pierādīsim, ka $\text{LKD}(a, b) = \text{LKD}(a, c) = \text{LKD}(b, c)$.

Apzīmējam $\text{LKD}(a, b) = x$. Tātad gan a , gan b dalās ar x . Tā kā $\text{LKD}(b, c) = a + \text{LKD}(a, b) - b$ un vienādības labajā pusē visi locekļi dalās ar x , tad arī $\text{LKD}(b, c)$ dalās ar x . Tas nozīmē, ka arī c dalās ar x , līdz ar to arī $\text{LKD}(a, c)$ dalās ar x .

Tātad esam pierādījuši, ka $\text{LKD}(a, c)$ dalās ar $\text{LKD}(a, b)$. Līdzīgi varam pierādīt arī, ka $\text{LKD}(a, b)$ dalās ar $\text{LKD}(a, c)$. No tā secinām, ka $\text{LKD}(a, b) = \text{LKD}(a, c)$ un simetrijas dēļ $\text{LKD}(b, c) = \text{LKD}(a, b) = x$.

Ievietojot to dotajā vienādībā, iegūstam, ka $a + x = b + x = c + x$ jeb $a = b = c$.

2. atrisinājums. Pieņemsim, ka visi trīs skaitļi a, b, c dalās ar kādu naturālu skaitli y . Tādā gadījumā varam ievērot, ka arī skaitļi $a_1 = \frac{a}{y}$, $b_1 = \frac{b}{y}$ un $c_1 = \frac{c}{y}$ ir doto vienādojumu atrisinājums (tas izriet no tā, ka $\text{LKD}\left(\frac{a}{y}, \frac{b}{y}\right) = \frac{\text{LKD}(a, b)}{y}$).

Par y var izvēlēties visu trīs doto skaitļu lielāko kopīgo dalītāju un tālāk aplūkot skaitļus a_1, b_1 un c_1 , kam izpildās uzdevuma nosacījumi un kuru lielākais kopīgais dalītājs ir 1.

Līdzīgi kā 1. atrisinājumā varam iegūt, ka, ja $\text{LKD}(a_1, b_1) = x$, tad arī c_1 dalās ar x . Bet tā kā visu skaitļu lielākais kopīgais dalītājs ir 1, tad secinām, ka $\text{LKD}(a_1, b_1) = 1$.

Līdzīgi iegūstam, ka $\text{LKD}(b_1, c_1) = 1$ un $\text{LKD}(c_1, a_1) = 1$. Tātad $a_1 + 1 = b_1 + 1 = c_1 + 1$ jeb $a_1 = b_1 = c_1 = 1$.

11.5. Uz galda stāv n kastes, kurās ir āboli un bumbieri, katrā kastē ir vismaz viens ābols un vismaz viens bumbieris. Zināms, ka kastes var sakārtot rindā gan tā, ka katrā nākamajā kastē ir par vienu ābolu vairāk nekā iepriekšējā, gan tā, ka katrā nākamajā kastē ir par vienu bumbieri vairāk nekā iepriekšējā, gan tā, ka katrā nākamajā kastē ir par vienu augli vairāk nekā iepriekšējā. Vai iespējams, ka: **a)** $n = 2024$; **b)** $n = 2025$?

Atrisinājums. **a)** Pamatosim, ka $n = 2024$ nav iespējams. Izmantosim pierādījumu no pretējā. Pieņemsim, ka mums ir tādas 2024 kastes ar augļiem, kas atbilst uzdevuma nosacījumiem. Tā kā kastes var pārkārtot tā, ka katrā nākamajā kastē ir par vienu ābolu vairāk nekā iepriekšējā, tad varam secināt, ka ābolu skaits šajā sakārtojumā ir 2024 pēc kārtas esoši naturāli skaitļi. Ja ar a apzīmējam mazāko ābolu skaitu kādā kastē, tad lielākais skaits būs $a + 2023$. Pie tam varam secināt, ka ābolu kopā ir $\frac{a+(a+2023)}{2} \cdot 2024 = 1012(2a + 2023)$. Līdzīgi varam spriest par bumbieriem, tas ir, ja mazāko bumbieru skaitu apzīmējam ar b , tad kopējais bumbieru skaits ir $1012(2b + 2023)$. Vēl ir dots, ka šīs kastes var sakārtot tā, lai kopējais augļu skaits veidotu pēc kārtas esošu naturālu skaitļu virkni. Ja apzīmējam mazāko augļu skaitu ar k , tad kopējais augļu skaits visās kastēs ir $1012(2k + 2023)$, jo augļu skaits kastēs ir pēc kārtas esoši naturāli skaitļi. Ievērojot, ka kopējais augļu skaits būs arī $1012(2a + 2023) + 1012(2b + 2023) = 1012(2a + 2023 + 2b + 2023)$. Tātad jābūt, ka

$$\begin{aligned} 1012(2a + 2023 + 2b + 2023) &= 1012(2k + 2023); \\ 2(a + b + 2023) &= 2k + 2023. \end{aligned}$$

Iegūstam pretrunu. Vienādības kreisās puses vērtība ir pāra skaitlis, bet labās puses izteiksmes vērtība ir nepāra skaitlis. Tātad pieņēmums ir aplams un nav iespējams, ka uz galda ir 2024 kastes.

b) Parādīsim, kā izveidot kastes ar augļiem tā, lai izpildītos uzdevuma nosacījumi, ja $n = 2025$. Saliksim augļus tā, ka gan ābolu, gan bumbieru skaits kastēs būs visi naturālie skaitļi no 1 līdz 2025, bet kopējās augļu skaits kastēs būs visi naturālie skaitļi no 1014 līdz 3038. Sakārtosim kastes vienā rindā. Kā salikt ābolus un bumbierus kastēs parādīts tabulā.


Kastes nr.	1.	2.	3.	...	1013.	1014.	1015.	...	2024.	2025.
Ābolu skaits	1	2	3	...	1013	1014	1015	...	2024	2025
Bumbieru skaits	2025	2023	2021	...	1	2024	2022	...	4	2
Kopā	2026	2025	2024	...	1014	3038	3037	...	2028	2027

Vispirms katrā kastē saliekam ābolus tā, ka pirmajā kastē ir 1 ābols un katrā nākamajā kastē ir par 1 ābolu vairāk nekā iepriekšējā (tātad pēdējā kastē ir 2025 āboli). Tad pirmajā kastē ieliksīm 2025 bumbierus, bet katrā nākamajā par 2 bumbieriem mazāk līdz pat 1013. kastei, kurā ieliksīm 1 bumbieri. Tālāk 1014. kastē ieliksīm 2024 bumbierus un atkal katrā nākamajā kastē ieliksīm par 2 bumbieriem mazāk nekā iepriekšējā līdz nonāksīm pie 2025. kastes, kurā ieliksīm 2 bumbierus.

Redzams, ka pirmajās 1013 kastēs augļu skaits ir attiecīgi no 2026 līdz 1014 (katrā nākamajā kastē par vienu mazāk), bet atlikušajās 1012 kastēs tas ir attiecīgi no 3038 līdz 2027 (katrā nākamajā kastē par vienu mazāk).

12.1. Šaurleņķu trijstūrī ABC novilkta augstumi AD , BE un CF , kas krustojas punktā H . Pierādīt, ka DH ir leņķa EDF bisektrise!

Atrisinājums. Tā kā $\sphericalangle HEC + \sphericalangle HDC = 180^\circ$, tad ap četrstūri $EHDC$ var apvilkt riņķa līniju un $\sphericalangle ECH = \sphericalangle EDH = \alpha$ kā ievilkto leņķi, kas balstās uz vienu un to pašu loku EH (skat. 9. att.). Taisnleņķa trijstūros AFC un AEB izmantojam iekšējo leņķu summu. Tātad $\sphericalangle CAF = 180^\circ - \sphericalangle AFC - \sphericalangle FCA = 90^\circ - \alpha$ un $\sphericalangle ABE = 180^\circ - \sphericalangle BEA - \sphericalangle BAE = 180^\circ - 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$. Ievērojam, ka $\sphericalangle HFB + \sphericalangle HDB = 180^\circ$, tad ap četrstūri $FBDH$ var apvilkt riņķa līniju un $\sphericalangle FDH = \sphericalangle FBH = \alpha$ kā ievilkto leņķi, kas balstās uz vienu un to pašu loku FH . Tātad $\sphericalangle HDE = \alpha = \sphericalangle FDH$ un DH ir leņķa EDF bisektrise.



9. att.

12.2. Reāliem skaitļiem x un y ir spēkā vienādība $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = 7$. Pierādīt, ka $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} + \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} > \sqrt{14}$.

1. **atrisinājums.** Reizinot dotās vienādības abas puses ar $(x^2 - y^2) \neq 0$, iegūstam:

$$(x+y)^2 + (x-y)^2 = 7(x^2 - y^2);$$

$$2x^2 + 2y^2 = 7x^2 - 7y^2 \Rightarrow y^2 = \frac{5}{9}x^2.$$

Ievietojam iegūto sakarību pierādāmās nevienādības kreisās puses izteiksmē:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} &= \frac{\frac{14}{9}x^2}{\frac{4}{9}x^2} + \frac{\frac{4}{9}x^2}{\frac{14}{9}x^2} = \frac{7}{2} + \frac{2}{7} = \frac{53}{14} = \sqrt{\left(3\frac{11}{14}\right)^2} = \sqrt{\left(4 - \frac{3}{14}\right)^2} = \sqrt{16 - \frac{24}{14} + \frac{9}{196}} = \\ &= \sqrt{14\frac{2}{7} + \frac{9}{196}} > \sqrt{14}. \end{aligned}$$

2. **atrisinājums.** Vienādojot saucējus izteiksmē $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y}$, iegūstam, ka

$$\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = \frac{(x+y)^2 + (x-y)^2}{(x+y)(x-y)} = \frac{x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2}{x^2 - y^2} = 2 \cdot \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}.$$


Tātad, ja $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = 7$, tad $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} = \frac{7}{2}$ un

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} + \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{7}{2} + \frac{2}{7} = \frac{53}{14} = \sqrt{\frac{53^2}{14^2}} = \sqrt{\frac{2809}{196}} = \sqrt{14\frac{65}{196}} > \sqrt{14}.$$

12.3. Taisnleņķa trijstūrī ABC ($\sphericalangle ABC = 90^\circ$) uz malas BC atlikti punkti D un E tā, ka $\sphericalangle EAC = \sphericalangle DAE = 2\sphericalangle BAD$, $BD = 1$, $DE = 3$. Aprēķināt EC garumu!

Atrisinājums. Apzīmēsim $EC = x$, $\sphericalangle BAD = \alpha$, $\sphericalangle DAE = \sphericalangle EAC = 2\alpha$ un punktiem D un E atliksim attiecīgi simetriskus punktus D_1 un E_1 pret taisni AB (skat. 10. att.). Tātad $BD_1 = BD = 1$ un $DE = D_1E_1 = 3$. Izmantosim bisektrises īpašību vairākos trijstūros un nogriežņu garumu vienādību $AD_1 = AD$; $AE_1 = AE$ (simetrijas dēļ):

- 1) $\triangle DAC$ bisektrise AE : $\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{EC} = \frac{3}{x}$;
- 2) $\triangle D_1AE$ bisektrise AD : $\frac{AD_1}{AE} = \frac{D_1D}{DE} \Rightarrow \frac{AD}{AE} = \frac{2}{3}$;
- 3) $\triangle E_1AC$ bisektrise AD : $\frac{AE_1}{AC} = \frac{E_1D}{DC} \Rightarrow \frac{AE}{AC} = \frac{5}{3+x}$.



10. att.

No 2) un 3) iegūstam, ka

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AD}{AE} \cdot \frac{AE}{AC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3+x} = \frac{10}{3(3+x)}$$

Izmantojot 1), iegūstam:

$$\frac{10}{3(3+x)} = \frac{3}{x} \quad \Rightarrow \quad 10x = 27 + 9x \quad \Rightarrow \quad x = 27.$$

Tātad $EC = x = 27$.

12.4. Pie lielas konfekšu kastes pienāk Māris un Kims. Viņi abi pamīšus ņem no kastes konfektes, Māris sāk pirmais. Katrā gājienā spēlētājs var izvēlēties patvaļīgu pirmskaitli p un patvaļīgu veselu nenegatīvu skaitli n un paņemt no kastes p^n konfektes. Uzvar tas spēlētājs, pēc kura gājiena kaste paliek tukša. Spēli sāk Māris. Kurš spēlētājs, pareizi spēlējot, vienmēr var uzvarēt, ja sākumā kastē ir: **a)** 20; **b)** 2024 konfektes?

Atrisinājums. Pamatosisim, ka Māris abos gadījumos var uzvarēt. Ievērosim, ka vienā gājienā drīkst paņemt 1; 2; 3; 4 vai 5 konfektes, bet nedrīkst paņemt 6 konfektes, tāpat nedrīkst paņemt konfekšu skaitu, kas ir 6 daudzkārtņis. Tātad Māris var spēlēt tā, lai pēc viņa gājiena atlikušo konfekšu skaits dalās ar 6. Tā kā nav iespējams paņemt konfekšu skaitu, kas sakrīt ar kādu skaitļa 6 daudzkārtņi, tad Kims vienmēr pēc sava gājiena konfekšu kaudzē atstās tādu skaitu, kas nedalīsies ar 6. Ņemot vērā, ka ir iespējams paņemt 1; 2; 3; 4 vai 5 konfektes, tad Māris vienmēr varēs panākt, ka pēc viņa gājiena kastē atlikušais konfekšu skaits dalīsies ar 6. Tā kā 0 dalās ar 6 (situācija, kad paņemtas visas konfektes), tad Māris ar šādu stratēģiju vienmēr uzvarēs.

Pirmajā gājienā **a)** gadījumā Mārim jāpaņem 2 (vai 8) konfektes, lai pāri paliktu 18 (vai 12) konfektes. Arī **b)** gadījumā pirmajā gājienā Māris var paņemt 2 konfektes, lai pāri paliktu 2022 konfektes, kas dalās ar 6 (Māris pirmajā gājienā var ņemt arī citu konfekšu skaitu, piemēram, 8; 32; 128; ...).

12.5. Atrast visus pirmskaitļu pārus $(p; q)$, kuriem izpildās vienādība $p^q = q^p + 7$.

Atrisinājums. Vispirms ievērosim, ka abi pirmskaitļi p un q vienlaicīgi nevar būt pāra skaitļi vai nepāra skaitļi. Ja $p = q = 2$, tad $2^2 \neq 2^2 + 7$. Ja gan p , gan q būtu nepāra skaitļi, tad p^q būtu nepāra skaitlis, bet $q^p + 7$ būtu pāra skaitlis, tādēļ vienādība nebūtu patiesa. Tādēļ tieši viens no abiem skaitļiem ir 2, bet otrs ir kāds nepāra pirmskaitlis. Apskatīsim gadījumu, ja $p = 2$. Tātad mums jāatrod visi nepāra pirmskaitļi q , lai izpildītos vienādība $2^q = q^2 + 7$. Apskatām divas mazākās q vērtības:

- ja $q = 3$, tad $2^3 = 8 \neq 16 = 3^2 + 7$;
- ja $q = 5$, tad $2^5 = 32 = 5^2 + 7$, tātad $(2; 5)$ ir derīgs skaitļu pāris.

Lai pamatotu, ka citu atrisinājumu nav, parādīsim, ka lielākām q vērtībām vienādības kreisās puses izteiksme vienmēr ir lielāka nekā labās puses izteiksme, tas ir, ka visiem naturāliem $q \geq 7$ izpildās $2^q > q^2 + 7$. Izmantosim matemātiskās indukcijas metodi.

Indukcijas bāze. Ja $q = 7$, tad $2^7 = 128 > 56 = 7^2 + 7$.

Induktīvais pieņēmums. Pieņemsim, ka nevienādība izpildās, ja $q = k \geq 7$, tas ir, $2^k > k^2 + 7$.

Induktīvā pāreja. Pierādīsim, ka nevienādība ir spēkā arī tad, ja $q = k + 1$, tas ir,

$$2^{k+1} > (k+1)^2 + 7 = k^2 + 2k + 8.$$

Izmantojam induktīvo pieņēmumu, ka $2^k > k^2 + 7$, un izteiksmju novērtēšanu, ievērojot, ka $k \geq 7$:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2(k^2 + 7) = k^2 + k^2 + 14 \geq k^2 + 7k + 14 > k^2 + 2k + 8.$$

Secinājums. Tā kā nevienādība ir patiesa, ja $q = 7$, un no tā, ka nevienādība ir spēkā, ja $q = k$, izriet, ka nevienādība ir spēkā arī $q = k + 1$, secinām, ka nevienādība ir spēkā visiem naturāliem skaitļiem $q \geq 7$.

Tātad vienādojumam $2^q = q^2 + 7$ nav atrisinājuma, ja $q \geq 7$.

Aplūkosim gadījumu, ja $q = 2$. Tātad mums jāatrod visi nepāra pirmskaitļi p , lai izpildītos vienādība $p^2 = 2^p + 7$ jeb $2^p = p^2 - 7$. No iepriekš pierādītā jau zināms, ka visiem $p \geq 7$ šī vienādība nav spēkā, jo tādā gadījumā $2^p > p^2 + 7 > p^2 - 7$. Atliek pārbaudīt gadījumus $p = 3$ un $p = 5$. Tie abi neder kā vienādojuma $2^p = p^2 - 7$ atrisinājumi, jo $2^3 \neq 3^2 - 7$ un $2^5 \neq 5^2 - 7$.

Līdz ar to vienīgais derīgais skaitļu pāris ir $(2; 5)$.

Piezīme. Gadījumu, ja $q = 2$, var pamatot, apskatot šo vienādojumu pēc moduļa 4. Tā kā $p \geq 3$, tad $2^p + 7 \equiv 0 + 3 \equiv 3 \pmod{4}$. Tā kā p ir nepāra skaitlis, tas ir, $p = 2n + 1$ kādam naturālam skaitlim n , tad $p^2 \equiv (2n + 1)^2 \equiv 4n^2 + 4n + 1 \equiv 1 \pmod{4}$. Tā kā $1 \not\equiv 3 \pmod{4}$, tad vienādojumam nav atrisinājuma, ja $q = 2$.